

MACITENTAN (Opsumit®)

Quelle est l'utilisation du macitentan (Opsumit®)?

Le macitentan (Opsumit®) est un médicament sur ordonnance utilisé pour traiter l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). L'HTAP est définie par une pression artérielle élevée dans les poumons due au fait que les artères pulmonaires, les vaisseaux sanguins qui transportent le sang du cœur vers les poumons, se sont rétrécies ou cicatrisées.

Comment le médicament agit-il?

Le macitentan (Opsumit®) est un antagoniste des récepteurs de l'endothéline (ARE) qui abaisse la tension artérielle dans les poumons, ce qui permet au cœur de pomper le sang plus efficacement. Le macitentan (Opsumit®) aide à prévenir le rétrécissement des vaisseaux sanguins en bloquant l'endothéline, une protéine qui cause la vasoconstriction, dans les artères pulmonaires. La prise de ce médicament peut ralentir la progression de l'HTAP et soulager ses symptômes.

Que dois-je savoir?

Contre-indications :

Ne prenez pas de macitentan (Opsumit®) si :

- Vous êtes allergique au macitentan (Opsumit®) ou à l'un de ses ingrédients
- Vous allaitez
- Vous avez une maladie grave du foie

Si vous êtes enceinte ou si vous êtes susceptible de le devenir, communiquez immédiatement avec votre équipe médicale; ce médicament est connu pour causer des anomalies congénitales graves.

Information importante :

Ce médicament peut causer de l'anémie; des analyses sanguines peuvent être effectuées de façon régulière pendant un an.

Interactions médicamenteuses

Les médicaments suivants peuvent interagir avec le macitentan (Opsumit®). Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des interactions médicamenteuses.

Veuillez parler avec votre équipe médicale avant de commencer à prendre tout nouveau médicament.

Les antibiotiques — p. ex., rifampine (Rofact®)

Les médicaments utilisés pour traiter des infections fongiques — p. ex., kétoconazole (Apo-Ketoconazole®) et voriconazole (Vfend®)

Les médicaments utilisés pour traiter une infection à VIH — p. ex., darunavir (Prezista®), ritonavir (Norvir®), nelfinavir (Viracept®)

Les médicaments utilisés pour les troubles convulsifs — p. ex., phénytoïne (Dilantin®) et carbamazépine (Tegretol®)

Comment dois-je prendre le macitentan (Opsumit®)?

Prenez un comprimé de 10 mg, une fois par jour, avec ou sans nourriture.

Dose oubliée :

Si vous oubliez de prendre une dose de macitentan (Opsumit®), prenez le comprimé dès que vous constatez cet oubli. Ne prenez pas deux doses en même temps. Si le moment est presque venu de prendre la dose suivante, ne prenez pas la dose oubliée; prenez simplement la dose suivante à l'heure prévue.

Remarque:

Veuillez mentionner à votre équipe médicale TOUS les médicaments que vous prenez, incluant les médicaments en vente libre, les vitamines, les minéraux, les suppléments et produits de santé naturels et les produits de médecine douce.

MACITENTAN (Opsumit®)

Quels sont les effets secondaires fréquents?

Certains patients peuvent présenter des effets secondaires quand ils prennent ce médicament. Si les effets secondaires sont graves ou inconfortables, veuillez communiquer avec votre équipe médicale. Les effets secondaires peuvent comprendre :

- Mal de tête
- Irritation des voies respiratoires et nasales (p. ex., congestion nasale)
- Symptômes semblables à ceux de la grippe
- Rétention de liquides (enflure)
- Infection des voies urinaires

Dans quelles circonstances devrais-je communiquer avec ma clinique d'HTP ou consulter un médecin?

Communiquez immédiatement avec votre équipe médicale ou consultez un médecin si vous présentez :

- Des symptômes d'une aggravation de l'HTP, incluant : une difficulté à respirer, une rétention de liquides ou une prise de poids et/ou des étourdissements ou une perte de conscience
- Une réaction allergique, incluant : une enflure au niveau de la bouche, de la langue, du visage ou de la gorge, des démangeaisons, une éruption cutanée et/ou de la difficulté à respirer

Si vous prenez une dose supérieure à la dose prescrite, communiquez immédiatement avec votre équipe médicale même si vous vous sentez bien.

N'arrêtez pas de prendre le macitentan (Opsumit®), à moins d'un avis contraire de la part de votre équipe médicale.

Renseignements additionnels :

Conservez le médicament hors de la portée des enfants à 15°-30° C.

N'utilisez pas de médicaments périmés.

Ne jetez aucun médicament dans un évier ou une toilette, ni dans les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien de quelle façon vous devez éliminer vos médicaments si vous n'en n'avez plus besoin.

Pour plus d'information, veuillez consulter la monographie complète du produit.



L'ASSOCIATION D'HYPERTENSION
PULMONAIRE DU CANADA
.....
PULMONARY HYPERTENSION
ASSOCIATION OF CANADA



Pour en apprendre davantage sur l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) et sur les traitements disponibles, veuillez visiter le www.ahtpcanada.ca/en-savoir-plus.

Cette ressource éducative a été élaborée par le Réseau des professionnels de la santé traitant l'HTP, un réseau de l'AHTP Canada qui réunit des infirmières du domaine de l'HTP provenant de partout au pays en vue d'améliorer les soins infirmiers dans ce domaine, et ce, en favorisant le leadership, l'éducation et le perfectionnement professionnel.

Les renseignements fournis dans la présente ressource sont destinés à des fins éducatives seulement. Veuillez communiquer avec votre équipe médicale pour établir un plan de traitement personnalisé et pour discuter de tout changement à votre mode de vie ou à votre plan de traitement.